

Příbalová informace: informace pro uživatele

Recreol 50 mg/g mast dexpanthenol

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Recreol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat
3. Jak se Recreol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Recreol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Recreol a k čemu se používá

Přípravek Recreol obsahuje léčivou látku dexpanthenol, která patří do skupiny přípravků k léčbě ran a vředů. Dexpanthenol se v tkáních přeměňuje na kyselinu pantothenovou. Kyselina pantothenová obnovuje pružnost pokožky a podporuje hojení ran.

Přípravek Recreol se používá:

k podpůrné léčbě povrchových poškození kůže různého původu. Pomáhá zvlhčovat vnější vrstvu kůže a podporuje hojení s následnými protizánětlivými a protisvěddivými účinky.

Přípravek Recreol lze používat u dětí, dospívajících a dospělých.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat

Nepoužívejte přípravek Recreol:

- jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- na rány, jestliže máte hemofilii (dědičná porucha srážlivosti krve) kvůli riziku závažného krvácení.

Upozornění a opatření

V případě alergické reakce je třeba používání přípravku Recreol ukončit.

Vyhnete se kontaktu přípravku Recreol s očima.

V případě použití přípravku Recreol v anogenitální oblasti (v okolí konečníku a genitálií) může být ovlivněna účinnost kondomů.

Při použití přípravku Recreol je zapotřebí zvláštní opatrnosti

Kvůli riziku těžkých popálenin během používání přípravku Recreol nekuřte ani se nepřibližujte k otevřenému ohni. Tkanina (oděv, lůžkoviny, obvazy atd.), která byla v kontaktu s tímto přípravkem, snadněji hoří a představuje vážné riziko vzniku požáru. Praní oděvů a lůžkovin může omezit usazování přípravku v nich, ale nikoli ho úplně odstranit.

Další léčivé přípravky a Recreol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neexistuje žádný důkaz o vzájemném působení přípravku Recreol s jakýmikoli léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Se souhlasem Vašeho lékaře může být přípravek Recreol používán během těhotenství nebo v období kojení.

Je třeba se vyvarovat místnímu použití v oblasti prsou, aby se zabránilo kontaktu s ústy dítěte.

Nebyly provedeny žádné studie účinku dexpanthenolu na plodnost člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Recreol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Recreol obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Recreol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Pokud není doporučeno jinak, má být mast u dospělých a dětí aplikována na postižené místo v tenké vrstvě jednou nebo několikrát denně podle potřeby.

Délka trvání léčby závisí na povaze a průběhu onemocnění. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Použití u dětí

Přípravek Recreol může být používán u dětí.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Recreol je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): alergické reakce, reakce přecitlivělosti (např. kožní záněť/alergické kožní reakce a podráždění kůže).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak **Recreol** uchovávat

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek **Recreol** obsahuje

- Léčivou látkou je dexpanthenol. Jeden gram masti obsahuje 50 mg dexpanthenolu.
- Dalšími složkami jsou stearylalkohol, cetylalkohol, bílý vosk, složený parafinový emulgátor (tekutý parafin, vazelína, ozokerit, glycerol-monooleát, alkoholy tuku z ovčí vlny), čištěný mandlový olej, bílá vazelína, tekutý parafin, tuk z ovčí vlny, čištěná voda.

Jak **Recreol** vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní nažloutlá mast s charakteristickým zápachem.

30 g nebo 50 g masti v hliníkové tubě. Tuba je uzavřena hliníkovou membránou a opatřena bílým šroubovacím uzávěrem. Hliníková tuba je uložena v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Estonsko	Recreol
Lotyšsko	Recreol 50 mg/g ziede
Litva	Recreol 50 mg/g tepalas
Česká republika	Recreol
Slovenská republika	Recreol 50 mg/g masť
Maďarsko	Recreol 50 mg/g kenőcs
Finsko	Recreol 50 mg/g voide
Polsko	Recreol
Rumunsko	Recreol 50 mg/g unguent
Portugalsko	Recreol 50 mg/g pomada

Slovinsko	Recreol 50 mg/g mazilo
Rakousko	Recreol 50 mg/g Salbe
Německo	Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Salbe

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 3. 2024.