Fresubin® Renal

LOW IN PROTEIN

2,0 kcal (8,4 kJ)/ml

KCAL (kJ)	PROTEIN (g)
(1680) 400	6
CHO/KH/G° (g)	**LIPID (g)**
52,8	17,8 (EPA+DHA 0,12)

° Glucides

Per/Pour/Por 200 ml

Smak **Vanilje**
Γεύση **Βανίλια**
Příchuť **Vanilková**
Príchuť **Vanilková**

FRESENIUS KABI

Smaker best kald! • Σερβίρεται κατά προτίμηση δροσερό! • Nejlépe chutná vychlazený! • Najlepšie chutí vychladený!

FRESENIUS KABI

www.fresenius-kabi.com

LOT :

▶ Best før
utgangen av/
Ανώλοση κατά
πρότιμση πριν
από το τέλος/
Minimální
trvanlivost do
konce/Minimálna
trvanlivosť do
konca.

Fresubin® Renal

e 4 x 200 ml
(= 800 ml)

NO **Næringsmiddel til spesielle medisinske formål.** Ernæringsmessig fullverdig, energirikt (2 kcal/ml) næringstilskudd og sondeløsning med fiber. Lavt protein- (6 Energi %) og elektrolyttinnhold. Med fiskeolje. Karbohydratmodifisert med stivelse og isomaltulose. Laktoseredusert. Glutenfri. Til ernæringsmessig behandling av pasienter med eller i risiko for underernæring, spesielt ved kronisk- eller ikke-katabol akutt nyresvikt.

GR **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Πλήρες θρεπτικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας (2 kcal/ml), χορηγούμενο από του στόματος ή μέσω καθετήρα σίτισης, με φυτικές ίνες. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (6 %) και ηλεκτρολύτες. Με ιχθυέλαιο. Τροποποιημένος υδατάνθρακας με άμυλο και ισομαλτουλόζη. Κλινικά ελεύθερο λακτόζης και γλουτένης. Για τη διατροφική αγωγή ασθενών με ή που διατρέχουν κίνδυνο υποθρεψίας, ειδικότερα για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή μη καταβολικές μορφές οξείας νεφρικής βλάβης.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Nutričně kompletní, vysokokalorická (2 kcal/ml) výživa určená na doplnění běžné stravy popíjením a na podávání sondou. Obsahuje vlákninu, má snížený obsah bílkovin (6 % energetické hodnoty) a elektrolytů. Obsahuje rybí olej, sacharidy modifikované škrobem a izomaltulózu. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku onemocnění souvisejících s malnutricí, zejména pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin nebo nekatabolickými formami akutního poškození ledvin.

SK **Potravina na osobitné lekárske účely.** Nutrične kompletná vysokokalorická (2 kcal/ml) výživa na doplnenie bežnej stravy popíjaním a na podávanie sondou. Obsahuje vlákninu, má znížený obsah bielkovín (6 % energetickej hodnoty) a elektrolytov. Obsahuje rybí olej, sacharidy modifikované škrobom a izomaltolózou. Klinicky je bez laktózy, bez lepku. Na diétny režim pacientov pri súčasnej alebo hroziacej podvýžive, najmä pre pacientov s chronickým ochorením obličiek alebo pri nekatabolických formách akútneho poškodenia obličiek.

Gjennomsnittlig innhold/Μέση περιεκτικότητα/Průměrný obsah/Priemerný obsah _ Pr./Gvd/na 100 ml:

Na	68 mg	Ca	84 mg	Fe	2,0 mg
K	100 mg	Mg	20 mg	Zn	1,8 mg
Cl	62 mg	P	55 mg	Cu	200 µg
Mn	0,4 mg	Cr	3,0 µg	I	20 µg
F	0,3 mg	Mo	7,0 µg	Se	10 µg

Gjennomsnittlig innhold/Μέση περιεκτικότητα/Průměrný obsah/Priemerný obsah _ Pr./Gvd/na 100 ml:

Vit. D2/D3	1,0 µg
Vit. E/Βιτ. E	3,0 mg α-TE
Vit. K1/Βιτ. K1	10,5 µg
Vit. B1/Βιτ. B1	0,26 mg
Vit. B2/Βιτ. B2	0,3 mg
Niacin/Νιασίνη	3,4 mg (4,2 mg NE)
Vit. B6/Βιτ. B6	0,67 mg
Vit. B12/Βιτ. B12	0,6 µg
Pantothenic acid/Παντοθενικό οξύ/Kyselina pantothenová/Kys. pantoténová	1,2 mg
Biotin/Βιοτίνη/Biotin	12 µg
Folic acid/Φολικό οξύ/Kyselina listová/Kys. listová	100 µg
Vit. C/Βιτ. C	10 mg
Taurine/Ταουρίνη/Taurin	55 mg
Choline/Χολίνη/Cholin	20 mg
L-Carnitine/L-Καρνιτίνη/L-karnitin	10 mg
Inositol/Ινοσιτόλη/Inositol	24 mg

Pr./Gvd/na 100 ml:

Vit. D2/D3/Βιτ. D2/D3	1,0 µg
Vit. E/Βιτ. E	3,0 mg α-TE
Vit. K1/Βιτ. K1	10,5 µg
Vit. B1/Βιτ. B1	0,26 mg
Vit. B2/Βιτ. B2	0,3 mg
Niacin/Νιασίνη	3,4 mg (4,2 mg NE)
Vit. B6/Βιτ. B6	0,67 mg
Vit. B12/Βιτ. B12	0,6 µg
Pantothenic acid/Παντοθενικό οξύ/Kyselina pantothenová/Kys. pantoténová	1,2 mg
Biotin/Βιοτίνη/Biotin	12 µg
Folic acid/Φολικό οξύ/Kyselina listová/Kys. listová	100 µg
Vit. C/Βιτ. C	10 mg
Taurine/Ταουρίνη/Taurin	55 mg
Choline/Χολίνη/Cholin	20 mg
L-Carnitine/L-Καρνιτίνη/L-karnitin	10 mg
Inositol/Ινοσιτόλη/Inositol	24 mg

Vit. D2/D3	1,0 µg
Vit. E/Βιτ. E	3,0 mg α-TE
Vit. K1/Βιτ. K1	10,5 µg
Vit. B1/Βιτ. B1	0,26 mg
Vit. B2/Βιτ. B2	0,3 mg
Niacin/Νιασίνη	3,4 mg (4,2 mg NE)
Vit. B6/Βιτ. B6	0,67 mg
Vit. B12/Βιτ. B12	0,6 µg
Pantothenic acid/Παντοθενικό οξύ/Kyselina pantothenová/Kys. pantoténová	1,2 mg
Biotin/Βιοτίνη/Biotin	12 µg
Folic acid/Φολικό οξύ/Kyselina listová/Kys. listová	100 µg
Vit. C/Βιτ. C	10 mg
Taurine/Ταουρίνη/Taurin	55 mg
Choline/Χολίνη/Cholin	20 mg
L-Carnitine/L-Καρνιτίνη/L-karnitin	10 mg
Inositol/Ινοσιτόλη/Inositol	24 mg

Gjennomsnittlig innhold/Μέση περιεκτικότητα/Průměrný obsah/Priemerný obsah

Energi/Ενέργεια/Energetická hodnota	8400 kJ/2000 kcal
Fett/Λιπαρά/Tuky	40 kJ/8,9 g
Herav metade fettsyrer/Εκ των οποίων κορεσμένα/z toho nasycené mastné kyseliny	2,7 g
Herav MCT/Εκ των οποίων MCT/z toho MCT	2,2 g
Herav EPA/Εκ των οποίων EPA/z toho EPA	0,04 g
Herav Flerumettede fettsyrer/Εκ των οποίων πολυακόρεστα/z toho polynenasycené mastné kyseliny	1,47 g
Herav Enumettede fettsyrer/Εκ των οποίων μονοακόρεστα/z toho mononenasycené mastné kyseliny	4,7 g
Karbohydrater/Υδατάνθρακες/Sacharidy	53 kJ/6,3 g
Herav sukkerarter/Εκ των οποίων ζάχαρα/z toho cukry	8,17 g
Herav laktose/Εκ των οποίων λακτόζη/z toho laktóza	0,17 g
Fiber/Φυτικές ίνες/Vláknina	1,2 g
Protein/Πρωτεΐνες/Bílkoviny	6 kJ/0,3 g
Salt/Αλάτι/Sůl/Sól/Sir (Na x 2,5)	0,17 g
Vann/Νερό/Voda	71 ml
Osmolaritet/Ωσμωτικότητα/Osmolarita	500 mosmol/l
Osmolalitet/Ωσμωμοριακότητα/Osmolalita	710 mosmol/kg H2O
Vit. A/Βιτ. A	81,3 µg RE
Herav β-karoten/Εκ των οποίων β-καροτένιο/z toho β-karotén	33,3 µg RE

Gjennomsnittlig innhold/Μέση περιεκτικότητα/Průměrný obsah/Priemerný obsah

Tørrstoff/Ξηρά ουσία/Sušina	16 g
Herav DHA/Εκ των οποίων DHA/z toho DHA	0,02 g
Karbohydrater/Υδατάνθρακες/Sacharidy	53 kJ/6,3 g
Herav sukkerarter/Εκ των οποίων ζάχαρα/z toho cukry	8,17 g
Herav laktose/Εκ των οποίων λακτόζη/z toho laktóza	0,17 g
Fiber/Φυτικές ίνες/Vláknina	1,2 g
Protein/Πρωτεΐνες/Bílkoviny	6 kJ/0,3 g
Salt/Αλάτι/Sůl/Sól/Sir (Na x 2,5)	0,17 g
Vann/Νερό/Voda	71 ml
Osmolaritet/Ωσμωτικότητα/Osmolarita	500 mosmol/l
Osmolalitet/Ωσμωμοριακότητα/Osmolalita	710 mosmol/kg H2O
Vit. A/Βιτ. A	81,3 µg RE
Herav β-karoten/Εκ των οποίων β-καροτένιο/z toho β-karotén	33,3 µg RE

NO **Dosering:** Skal vurderes ut i fra pasientens behov av relevant ernæringsbehandling og sondeløsning er 2-3 flasker (800-1200 kcal)/døgn, som tilvirkning erstatning 3 flasker (2000 kcal)/døgn. Vikke opp/ytterligere: Skal anvendes under medisinsk kontroll. Tilførselshastigheten skal overvåkes ved bruk som sondeløsning. Egnet som eneste ernæringskilde. Ikke egnet til bæm < 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn < 6 år. Ikke egnet til pasienter med dårlig fordøyelse og dårlig opptak av næringsstoffer. Skal anvendes under medisinsk kontroll. Tilførselshastigheten skal overvåkes ved bruk som sondeløsning. Egnet som eneste ernæringskilde. Ikke egnet til bæm < 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn < 6 år. Ikke egnet til pasienter med dårlig fordøyelse og dårlig opptak av næringsstoffer.

GR **Δοσολογία:** Πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρικό σύμβουλο σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, η ημερήσια δόση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2-3 φιαλών (800-1200 kcal/μέρος) ή ισοδύναμη ποσότητα σε σωλήνα διατροφής. Η ταχύτητα χορήγησης θα πρέπει να παρακολουθείται εάν χρησιμοποιείται ως σωλήνας διατροφής. Κατάλληλο μόνο ως μοναδική πηγή διατροφής. Δεν ενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας < 3 ετών. Δεν χορηγείται σε ασθενείς με δυσκολία στη πέψη ή στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Χορηγείται με προσοχή εάν χρησιμοποιείται ως σωλήνας διατροφής. Κατάλληλο μόνο ως μοναδική πηγή διατροφής. Δεν ενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας < 3 ετών. Δεν χορηγείται σε ασθενείς με δυσκολία στη πέψη ή στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

CZ **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro dospělé je 2-3 lahvičky (800-1200 kcal)/den nebo ze celkovou výživu ≥ 5 lahviček (2000 kcal)/den.